




# Tělesné důkazy o mučení

Autor: Prof. Thomas Wenzel  
Vídeňská lékařská univerzita, Rakousko

This work is licensed  
under a



**ARTIP: Awareness Raising and Training Measures  
for the Istanbul Protocol in Europe**

[www.istanbulprotocol.info](http://www.istanbulprotocol.info)



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

Tělesné důkazy o mučení

# A. STRUKTURA POHOVORU

# A. Struktura pohovoru

Základní strategie: objektivní, nesmí přivodit (opakované) trauma, zdvořilý, získání informovaného souhlasu, vyřešení otázek důvěrnosti informací

Poskytujte

- srozumitelné informace
- dostatek času, zejména je-li klient rozrušený
- přestávky na základě žádosti nebo potřeby

→ *(viz též kapitoly na téma pohovorů a získávání psychologických důkazů v modulu věnovanému stresu během pohovorů!)*

Tělesné důkazy o mučení

# B. ANAMNÉZA

# B. Anamnéza

- Dřívější anamnéza

Onemocnění, poruchy  
a poranění před  
mučením nebo  
z dřívějšího mučení

- Mučení

Mučení: podoby, délka  
trvání, použité nástroje

- Akutní projevy
- Chronické/dlouhodobé  
projevy


Intenzita, četnost, délka  
trvání, potíže,  
poskytnutá péče,  
poškození

Tělesné důkazy o mučení

# C. TĚLESNÉ VYŠETŘENÍ

# C. Tělesné vyšetření

- Provádí se obvykle po zjištění anamnézy.
- Prostudujte si předchozí kapitoly věnované přípravě prostředí a citlivé komunikace s klientem.
- Ve věznicích by měly být co nejlépe využity dostupné zdroje, včetně nákresů postavy (viz přílohu k IP) a fotoaparátů, jestliže je správa věznice dovolí.



# C. Tělesné vyšetření

## Kůže



→ Obzvláště důležitou roli hrají fotografie – viz samostatné kapitoly a moduly



# C. Tělesné vyšetření

## Kůže

- V mnoha zemích se pachatelé snaží využívat takové metody mučení, které nezanechávají očividné stopy.
- Kůže však, coby „vnější vrstva“ těla, vydává svědectví o většině poranění způsobených mučením.
- Všechny případné stopy je třeba zdokumentovat a uvést do vztahu s oznámenými (případně i s doposud neoznámenými) případy mučení.

# C. Tělesné vyšetření

## Kůže

- Co nejkvalitnější fotografická dokumentace představuje klíčový prvek v dokumentaci poranění; zejména stopy, jakými jsou hematomy (barevné změny v důsledku uzavřeného poranění), se během času rychle ztrácejí.
- Není-li k dispozici řádné vybavení, je i jednoduchá fotografie nebo i nákres lepší než žádná dokumentace.

# C. Tělesné vyšetření

## Kůže

- Co nejkvalitnější fotografická dokumentace představuje klíčový prvek v dokumentaci poranění; zejména stopy, jakými jsou hematomy (barevné změny v důsledku uzavřeného poranění), se během času rychle ztrácejí.
- Není-li k dispozici řádné vybavení, je i jednoduchá fotografie nebo i nákres lepší než žádná dokumentace.
- Samostatný modul projektu ARTIP se proto věnuje postupům k pořízení kvalitnějších fotografií.

# C. Tělesné vyšetření

## Kůže

- Běžný typ **jizev** bývá následkem popálenin (často od cigaret), bití (je-li kůže poškozena) a řezných ran nožem, střepem skla a podobných řezných nástrojů.



Jizva kruhového tvaru po mučení hořící cigaretou, starší.

# C. Tělesné vyšetření

**Kůže:**

**Popis:**

- 1) Popis umístění (použití nákres z IP), symetrické, asymetrické
- 2) Tvar: kulatý, oválný, podlouhlý atd.
- 3) Velikost: použití pravítka
- 4) Barva
- 5) Povrch: šupinatý, strupovitý, vředovitý, puchýřový, nekrotický
- 6) Okraj: pravidelný nebo nepravidelný, zóna na okraji
- 7) Ohraničení: zřetelné, nezřetelné
- 8) Výška v porovnání s okolní kožní tkání: atrofie, hypertrofie, rovina

# C. Tělesné vyšetření

## Kůže

„Falanga“ (bití chodidel) může na klenbě chodidla zanechat zhmožděninny a na chodidlech otoky sahající od klenby po středovou část chodidel a kotníků<sup>1</sup>.

Další poranění, například jizvy, mohou vznikat, jsou-li oběti falangy navíc nuceny chodit po kamení nebo skleněných střepech.

➔ Viz též rozšířený modul „Falanga“

# C. Tělesné vyšetření

## Obličej I

### Oči

Dle potřeby použijte odborné doporučení. Může být vyžadováno vyšetření výpočetní tomografií, magnetickou rezonancí (MRI) nebo ultrazvukové vyšetření (sonografie) ultrazvukem s vysokým rozlišením.

### Uši

Příklad: „telefono“ (opakované údery do ucha) způsobující roztržení bubíkové membrány. Může být třeba provést laboratorní testy, vyšetření CT a MRI.

### Nos

Časté zlomeniny. Rentgen nebo CT (zejména při krvácení z nosu), případně MRI

# C. Tělesné vyšetření

## Obličej II

### Čelist, orofarynx a krk

Časté zlomeniny/vykloubení dolní čelisti a syndrom temporomandibulárního kloubu. Krepitace jazyky, poškození hrtanu. Stopy/popáleniny po zásahu elektrickým proudem.



### Ústní dutina a zuby

Všeobecný stav (zlomené, vytržené, uvolněné zuby), možná poranění po zásahu elektrickým proudem (popáleniny, rozkousaný jazyk nebo rty). Může být třeba provést rentgen, CT a MRI.



# C. Tělesné vyšetření

## Muskuloskeletální soustava



Fotografická dokumentace

Fyzické vyšetření, včetně  
neurologického

Rentgen

Ultrazvuk (sonografie)

CT/MRI kloubů

Scintigrafie kostí

# C. Tělesné vyšetření

## Hrudník a břišní krajina

Všeobecný stav, hematomy, tržná poranění a vnitřní zranění (ledviny!). Může být vyžadováno vyšetření rentgenem, CCT, MRI, ultrazvukem nebo radioscintigrafií.

## Muskuloskeletální soustava

Časté klidové bolesti a přehnané pohyby. Může být vyžadováno vyšetření rentgenem, CCT, MRI a radioscintigrafií. Zvažte možnost zánětu kosti a kostní dřeně, denervace svalů a chronický kompartmentový syndrom.

## Genitourinární systém

Dutina: sexuální trauma. Může být vyžadováno vyšetření ultrazvukem (sonografie).

# C. Tělesné vyšetření

## Centrální a periferní nervová soustava

- **Zvláštní otázky:**  
Brachiální plexopatie  
(asymetrická tloušťka rukou, pokles zápěstí, slabost paží). Kontrola na případnou radikulopatii.
- Mohou být nezbytná vyšetření CT, MRI, EEG a měření nervové vodivosti.

# C. Tělesné vyšetření

## Centrální a periferní nervová soustava

- Častými a přehlíženými stavy jsou vnitřní poranění mozku (následkem bití nebo pádu) a intracerebrální krvácení.
- Zejména intracerebrální krvácení je akutní, život ohrožující stav, který musí být rozpoznán a u kterého musí být neprodleně zahájena terapie. Prvními projevy mohou být ztráty vědomí, závratě a zvracení. Tyto projevy vyžadují rychlý zásah.

# C. Tělesné vyšetření

## Centrální a periferní nervová soustava

- Traumatické poškození mozku, i mírné, může způsobit řadu dlouhodobých a chronických potíží, například poruchy spánku, poruchy paměti a zvýšenou dráždivost (pootřesový syndrom; PCS).
- Projevy mohou být podobné nebo dokonce stejné jako u posttraumatické stresové poruchy coby nejčastější psychické reakce na mučení.

# C. Tělesné vyšetření

## Centrální a periferní nervová soustava

- Stanovení diagnózy může být obtížné a může vyžadovat neuropsychologické vyšetření a zvláštní metodu MRI zaměřenou na zjištění uzavřeného poranění bez zjevného intracerebrálního krvácení.
- Negativní nález nemůže vyloučit přítomnost pootřesového syndromu (PCS).

# D. Vyšetření a vyhodnocení následujících zvláštních forem mučení

Ve zprávě se obvykle používají následující kvalifikace:

Není konzistentní s... (nemohla být způsobena čím...)

Je konzistentní s ... (nespecifická, mohla být způsobena čím... nebo jinými faktory)

Vysoce konzistentní s... (omezený počet dalších možností)


Typická pro ... (obvykle zjišťována po..., připuštění dalších možností)

Diagnostika čeho... (mohla být způsobena výhradně čím...)

# D. Vyšetření a vyhodnocení následujících zvláštních forem mučení

## Poznámka:

kvalifikace nebo požadované znění se může lišit v závislosti na místních normách a legislativě. Istanburský protokol nabízí příklad, není závaznou normou.






## D. Vyšetření a vyhodnocení následujících zvláštních forem mučení

Všeobecná konzistentnost (nikoli konzistentnost mezi určitou technikou mučení nebo traumatem a specifickými poraněními) je (v závislosti na normách ohledně soudního lékařství platných v příslušné zemi) součástí závěrečné zprávy.

→ Podrobnosti: a) rozšířené moduly; b) Atlas mučení; c) IP.



Tělesné důkazy o mučení

# E. SPECIALIZOVANÉ DIAGNOSTICKÉ TESTY

# E. Specializované diagnostické testy

- V závislosti na situaci (dostupnost, pravděpodobná poranění, cíl a využití výsledků (soudní řízení, diagnostika, terapie)) mohou být vyžadována vysoce specializovaná vyšetření. Potřeba by měla být úměrná míře stresové zátěže pro klienta a případným vedlejším účinkům.
- Jsou-li specializovaná vyšetření indikována, avšak nelze je ihned provést, je třeba taková vyšetření v závěrečné zprávě doporučit a současně označit za doposud neprovedená.
- Negativní nálezy nesmí vylučovat možné mučení.



Viz přílohu k IP a úskalí modulu